

胃内有泡性粘液除去剤

# ジメチコン内用液2%「FSK」

| *Dimethicone Oral Solution 2% "FSK"* |

- 使いやすいさに配慮した容器デザイン
- 低粘性で飲みやすい
- 良好な消泡性・抑泡性



商品名	和名	ジメチコン内用液2%「FSK」	承認番号	30200AMX00615000	日本標準商品分類番号	872318
	洋名	Dimethicone Oral Solution 2% "FSK"	承認年月	2020年 7月	薬効分類名	胃内有泡性粘液除去剤
一般名	和名	シリコーン樹脂	薬価基準収載	2020年 12月	使用期限	製造後3年(外箱及びラベルに表示)
	洋名	Polydimethylsiloxane-Silicone Dioxide Mixture	販売開始年月	1974年 2月	再評価結果	1982年 1月
組成・性状	(組成) 本剤は1mL中にシリコーン樹脂20mgを含有する。 添加物として、カルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ポリソルベート80、安息香酸、サッカリンナトリウム水和物、pH調節剤、香料を含有する。			【有効成分に関する理化学的知見】		
	(製剤の性状) 本剤は振り混ぜるとき、白色～淡黄白色の乳剤である。			一般名	シリコーン樹脂	
			化学名	Polydimethylsiloxane-Silicone Dioxide Mixture (ジメチルポリシロキサン・二酸化ケイ素混合物)		
			構造式	$\text{CH}_3 - \left[ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\   \\ \text{SiO} \\   \\ \text{CH}_3 \end{array} \right]_n - \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\   \\ \text{Si} \\   \\ \text{CH}_3 \end{array} + \text{SiO}_2$		
			性状	無～淡灰色で、透明若しくは半透明の粘稠な液体又はペースト状の物質で、ほとんどにおいが無い。		
効能又は効果	胃内視鏡検査時における胃内有泡性粘液の除去 胃腸管内のガスに起因する腹部症状の改善 腹部X線検査時における腸内ガスの駆除					
用法及び用量	<b>1.胃内視鏡検査時における胃内有泡性粘液の除去に使用する場合</b> 検査15～40分前にジメチルポリシロキサンとして、通常成人40～80mg(本剤2～4mL)を約10mLの水とともに経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。 <b>2.胃腸管内のガスに起因する腹部症状の改善に使用する場合</b> ジメチルポリシロキサンとして、通常成人1日120～240mg(本剤6～12mL)を食後又は食間の3回に分割経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。 <b>3.腹部X線検査時における腸内ガスの駆除に使用する場合</b> 検査3～4日前よりジメチルポリシロキサンとして、通常成人1日120～240mg(本剤6～12mL)を食後又は食間の3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。					
使用上の注意	<b>1.副作用</b> (1)その他の副作用					
		0.1%～5%未満	0.1%未満			
	消化器	軟便、胃部不快感、下痢、腹痛、嘔吐、嘔気、胃部重圧感、食欲不振				
	その他			頭痛		
取扱い上の注意	<b>1.安定性試験</b> 最終包装製品を用いた安定性試験の結果、ジメチコン内用液2%「FSK」は通常の市場流通下において、使用期限までの間安定であることが推測された。 <b>2.よく振って使用すること。</b> <b>3.使用期限内に使用すること。(使用期限内であっても開栓後は速やかに使用すること。)</b>					
包装	300mL					
文献請求先	伏見製薬株式会社 営業企画部 住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町2-41-5 TEL：03-5328-7801 FAX：03-5328-7802					

■ 詳細は製品添付文書をご参照ください。

■ 添付文書の改訂に十分ご留意ください。